

Plumosa Aurea

Juniperus Chinensis

Popis kultivaru:

Krovitý, nepravidelný tvar, vetvičky sú zlato - žlté.

Pomaly rastúci kultivar.

Dorastá do maximálnej výšky 2m.

Znáša strihanie ktoré podporuje hustnutie vetvičiek.

Pestuje sa v skupinkách. Vhodný do orientálnych záhrad, vresovísk a do skaliek.

Krajina pôvodu kultivaru:

Veľká Británia

Vyšlachtený alebo známy od roku:

1884

Meno autora alebo škôlka pôvodu ak sú známe:

Obvyklá výška x šírka vo veku 10r.:

1,5 x 1,2m

Poznámka: **kultivar Juniperus x media - j. x pfitzeriana**

Popis druhu:

Borievka Čínska je pôvodom z Číny.

Je to druh široko - kuželovitého tvaru, vysoký viac ako 10m a široký až 4m. Znáša znečistené ovzdušie.

Darí sa jej na vápenatých pôdach, je plne mrazuvzdorná a nenáročná na svetlo.



Prihnojovanie - postačujú bežné dostupné kompletne hnojivá ktoré sa aplikujú spôsobom a v dávkach odporučených výrobcami.

Spôsob výsadby a zálievka:

Ihličnany pestované v kontajneroch sa môžu vysádzať počas celého roka ak práve nemrzne najlepšie však na jar alebo na jeseň. Rastlinu sadíme rovnako hlboko ako bola posadená v kontajneri.

Jamu je pred výsadbou potrebné zaliať vodou a po vsiaknutí vystlať substrátom určeným na pestovanie rastlín v kontajneroch alebo substrátom pre ihličnany. Po usadení sa rastlina prihrnie pôdou a znovu zaleje.

Na veternejších stanovištiach je potrebné rastlinu po výsadbe fixovať o oporu zo strany prevládajúcich vetrov.

Zálievka - v dobe letných horúčav s minimom zrážok je potrebné rastliny raz za 3-4 dni výdatne zaliať tak aby bola pôda mokrá aspoň do hĺbky 10-15cm. Rastliny je potrebné výdatne zaliať aj v zimnom období pred blížiacim sa obdobím mrazov ak pred tým dlhšie nepršalo a pôda je suchá. Ihličnany majú aj počas zimných mesiacov vysokú spotrebu vody ktorú nemôžu zo zamrzutej pôdy čerpať a ak s ňou neboli predzásobené hrozí im počas mrazov vyschnutie.

Najčastejšie choroby a škodcovia:

Borievka Čínska je v našich podmienkach odolná a nenáročná rastlina. Všeobecne platí, že rastliny ktorým sa venuje dostatočná pozornosť, sú zalievané a ošetrované sami ľahko odolávajú škodcom a hubovým chorobám. Najčastejším škodcom je *Lykopezis tujovay* alebo *Lykopezis borievkovay* ktorý nalieta v štádiu chrobáka od začiatku júna a zavrtáva sa v mieste vetvenia vetvičiek čím spôsobuje ich vädnutie a odlomenie. Rastliny je potrebné už v máji preventívne ošetriť insekticídmi a potom v 2-3 týždňových intervaloch pokračovať až do konca septembra.



Zimné sfarbenie

Taxonómia - zaradenie v rámci rastlinnej ríše

Oddelenie: Gymnospermae
Nahosemenné
Rod: Juniperus
Borievka

Trieda: Coniferospida
Ihličnaté
Druh: Horizontalis
Rozprestretá

Čeľaď: Cupressaceae
Cyprusovité
Kultivar: Plumosa Aurea
Plumosa Aurea